

DISPLASIA ECTODÉRMICA

Isabela de Assumpção Pontes, Dayana Nayara de Bittencourt, Marcia de Freitas Oliveira, Ana Marise Pacheco Andrade de Souza, Márcio Cristiano de Souza Rastelli, Alexandre Marcelo Reichow, Jorge Luis Alegria Toruno

Introdução: Displasias Ectodérmicas (DEs) são distúrbios do desenvolvimento dos tecidos derivados da ectoderme que se caracterizam por alterações na epiderme e suas estruturas acessórias. As primeiras observações referentes as pessoas portadoras de DEs é de 1792, quando o pesquisador Danz publicou um relato de uma displasia de ocorrência familiar. As mais frequentes anormalidades bucais em pacientes com Displasia Ectodérmica incluem irregularidades nas formas dos dentes, tanto na dentição decídua quanto na dentição permanente, caracterizando a hipodontia como sinal clínico intraoral mais comum que a anodontia. A xerostomia pode estar presente devido a anormalidades nas glândulas salivares, perda de dimensão vertical de oclusão devido à ausência de elementos dentários, associada à presença de discretas fissuras ao redor da boca e olhos. **Objetivo:** Relatar através de um caso clínico reabilitação oral de paciente com displasia ectodérmica, sendo confeccionada prótese parcial removível provisória para a arcada superior. **Relato de Caso:** Paciente B. F., gênero masculino, 7 anos, compareceu a clínica de odontopediatria da FURB para realizar uma consulta de revisão periódica. Na anamnese, paciente relatou desconforto na prótese provisória superior a qual usava há 2 anos. Referiu-se também que a mesma se encontrava sem retenção. Iniciou-se o tratamento com adequação do meio bucal, moldagem para obtenção do modelo superior e inferior e planejamento de uma nova prótese parcial removível provisória superior. Na sessão seguinte, ajustes da prova dos dentes em cera e enviado para laboratório para acrilização. O caso finalizou-se com a entrega da prótese parcial removível provisória e orientações. **Conclusão:** O paciente com Displasia Ectodérmica pode ser tratado de várias formas dependendo de cada caso em particular, sendo que a reabilitação com próteses removíveis está indicada na maioria dos casos para pacientes em crescimento. Esse tipo de tratamento tem apresentado resultados bastante satisfatórios, devolvendo função e estética para o paciente.

Palavras Chave: Displasia Ectodérmica; Reabilitação Oral; Prótese Parcial Removível Provisória.