

## CARGA IMEDIATA

*Julia Maria Kammer, Carla Leandro Demarchi, Ricardo Hochheim Neto*

**Introdução:** O tempo e a estética são requisitos fundamentais para os pacientes que buscam tratamento com implantes para substituir os dentes perdidos. Entre as principais vantagens da carga imediata estão as relacionadas com a necessidade dos pacientes de receberem as suas próteses no mesmo dia da instalação dos implantes, especialmente aqueles que nunca usaram nenhum tipo de prótese, e têm que usar uma removível provisória durante o período de osseointegração (dificuldade psicológica e funcional), além, de reduzir o número de procedimentos cirúrgicos e conseguir manter o nível dos tecidos moles (conservação estética) ao redor do implante. Alguns autores relatam maior contato osso-implante para os implantes submetidos à carga imediata. Consideram que a força oclusal parece iniciar aumento da circulação sanguínea no osso, aumentando o metabolismo e, conseqüentemente, promovendo a remodelação e formação de novo osso. A carga imediata pode ser realizada sem que os implantes sofram uma encapsulação fibrosa e, então, uma posterior falha. A micromovimentação do implante pode interferir no processo de reparação óssea, mas se esta variar entre 50µm a 150µm, não haverá interferência deste processo e poderá favorecer uma neoformação óssea seguida de corticalização deste tecido. **Objetivo:** Relatar um caso clínico de reabilitação oral através da colocação de quatro implantes com carga imediata, sem enxerto ósseo, em região de maxila. **Relato de caso:** Paciente do sexo feminino, onde foram instalados quatro implantes e o cicatrizador protético em uma mesma seção, em que o tecido mole foi suturado em volta do cicatrizador, deixando-o em posição adequada para proporcionar uma cicatrização mais estética da mucosa Peri implantar, evitando uma nova cirurgia de abertura. Em 24 horas foi confeccionada e instalada a prótese implantossuportada. **Conclusão:** Para a instalação de implantes com carga imediata deve-se levar em consideração a qualidade e quantidade óssea, a estabilidade inicial do implante, presença de hábitos parafuncionais e saúde geral. A substituição de uma peça dentária por um implante de forma imediata propicia a preservação dos tecidos moles e duros existentes ao redor do dente extraído, reduz o tempo de cicatrização, ademais de permitir ao paciente a recuperação estética da região afetada imediatamente depois da cirurgia.

**Palavras Chave:** Carga Imediata, Implante, Tempo Cirúrgico Único.