

DENTES SUPRANUMERÁRIOS: A IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO PRECOCE

Jéssica Alana Klitzke, Laís Duarte, Márcio Cristiano de Souza Rastelli

Introdução: A hiperdontia é classificada como uma anomalia de desenvolvimento, caracterizada pela presença de um número maior de dentes, ou seja, além da quantidade fisiológica de dentes que constituem as arcadas dentárias. Sua etiologia não é completamente conhecida. Os supranumerários são classificados dependendo da região que se localizam e de acordo com sua morfologia. Em relação a sua prevalência, a anomalia é mais prevalente na região anterior da maxila (pré-maxila) e no sexo masculino. **Objetivo:** Salientar a importância do diagnóstico precoce dos dentes supranumerários e relatar um caso clínico associado ao mesmo. **Relato de caso:** Paciente do sexo feminino, recebeu o diagnóstico em 2010 da presença de um dente supranumerário, na região apical compreendida entre os dentes 45 e 46, após realizar uma radiografia panorâmica de rotina pós-tratamento ortodôntico. Após exame clínico, o cirurgião dentista orientou a paciente a acompanhar o caso para a análise da evolução do mesmo. Porém, isso não aconteceu por negligência da paciente. Em 2013, a paciente voltou a procurar o cirurgião dentista e o mesmo pediu que fosse realizada uma tomografia computadorizada e a encaminhou para o cirurgião bucomaxilofacial. Foi proposta pelo cirurgião a remoção cirúrgica. Foram anestesiados o nervo alveolar inferior, lingual e bucal direito. Iniciou-se a cirurgia com uma incisão intrasulcular com lâmina 15 estendendo-se da região do 32 ao 47 por lingual. Em seguida, foi realizado o descolamento mucoperiosteal e osteotomia na região do dente retido, sob irrigação de soro fisiológico. Após a remoção do dente, a região foi lavada em abundância com soro fisiológico e suturas em colchoeiro vertical foram realizadas nas papilas interdentárias linguais com fio de seda 4-0. Prescreveu-se a seguinte medicação pós-operatória: Amoxicilina 875mg/cápsula de 12/12 horas por 7 dias, Nimesulida 100mg/comprimido de 12/12 horas por 3 dias, Tylex 30mg/comprimido 4/4 horas para ser usado em caso de dor e clorexidine 0,12% sem álcool duas vezes ao dia durante 7 dias. A paciente não apresentou queixas álgicas ou de parestesias. Após sete dias removeu-se a sutura. **Conclusão:** Dar ênfase ao diagnóstico precoce é essencial para um bom prognóstico. Dependendo da época da realização do diagnóstico pode-se optar por diferentes tratamentos, avaliando as condições em que o paciente se encontra. A intervenção cirúrgica é o tratamento adequado para a presença do dente supranumerário, porém o

momento ideal desse procedimento é que mais gera dúvidas nos cirurgiões-dentistas. A intervenção cirúrgica do caso clínico relatado ocorreu sem nenhuma intercorrência.

Palavras Chave: Dente Supranumerário, Hiperdontia, Diagnóstico.